

消毒注意事項

進行環境清理工作時，應戴口罩、塑膠手套，以及塑膠鞋套，並將市售漂白水以 1:9 稀釋成消毒液，潑灑在可能被污染的環境，5分鐘後再行清理，並於工作完畢時以肥皂澈底清洗雙手，降低感染風險。



稀釋漂白水泡製方式：

1份市售漂白水

+

9份清水



防鼠三不、環境我顧




不讓鼠來

封住生活環境中的孔洞或縫隙，避免老鼠入侵。



不讓鼠住

久未使用的房屋或倉庫、市場、夜市，以及排水溝易有老鼠出沒，應時常注意清潔整理，避免老鼠築窩。



不讓鼠吃

食品、廚餘、寵物飼料及垃圾應妥善封存，避免鼠類覓食。

防鼠3不 環境我顧



2026.01更新



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TWCDC



Taiwan CDC
LINE@



衛生福利部疾病管制署
Taiwan Centers for Disease Control

廣告

漢他病毒症候群簡介

由漢他病毒所引起的人畜共通傳染病，依臨床症狀分為兩類：

(一)漢他病毒出血熱併腎症候群

三大臨床表徵：

發燒、皮膚或黏膜出血、急性腎衰竭

(二)漢他病毒肺症候群

早期症狀為發燒、疲倦和嚴重地肌肉酸痛，伴隨有頭痛、腸胃不適等現象，並快速進展至呼吸衰竭及休克。



傳染媒介

(一)宿主動物：

鼠類為主要宿主。臺灣常見的傳染媒介為溝鼠及錢鼠。



溝鼠



錢鼠


(二)傳播方式：

- 1.吸入帶有漢他病毒之鼠類排泄物或分泌物(包括糞、尿、唾液)。
- 2.接觸遭病毒污染的物體。
- 3.被帶有病毒之鼠類動物抓咬傷。

(三)潛伏期：

- 1.漢他病毒出血熱併腎症候群：一般是2-4週。
- 2.漢他病毒肺症候群：數天至6週之間，平均約2週。

就醫資訊



當身體出現發燒、皮膚或黏膜出血、腸胃不適、背痛、視力模糊等症狀，且曾接觸鼠類動物的分泌物、排泄物或遭其抓咬傷，請儘速就醫，並主動告知相關動物接觸史等資訊，以及早獲得妥適治療。

如有不適
請速就醫

